




Mücadelesi :

1. Zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bahçelerde, Nisan ayı başından itibaren sirkeli tuzaklar asılır. Bahçenin kenarları boyunca, 1 sıra ve en fazla 5 metre aralıkla tuzaklar asılır. Aynı bahçe içindeki diğer ağaçlara ise, ağaç başına 4-5 adet sirkeli tuzak asılarak zararlının mücadelesinde kitle halinde tuzakla yakalama yöntemi uygulanır. Bu işleme yıl boyu devam edilir.
2. Kitle yakalama çalışması sırasında tuzaklarda yakalanan ergin popülasyonunda artış görülüyorsa kimyasal mücadele ile kombine edilir. Genelde *D. suzukii* popülasyonunda temmuz ayından itibaren başlayan artış sonbahar boyunca devam etmektedir.

ÖNEMLİ!

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak ilaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.

Bitki koruma ürünleri tavsiye edilen şekilde, uygun zamanda ve dozda kullanılmalıdır.

Uygulamalar günün serin saatlerinde ve rüzgârsız havalarda yapılmalı

Ambalaj atıkları ve artan kimyasallar usulünce imha edilmelidir.

Uygulama esnasında koruyucu maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.

İLETİŞİM

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Adres: Olgunlar Mahallesi İshak
Sunguroğlu Sokak No:7 ELAZIĞ

Telefon: 0(424) 241 16 16

Faks: 0(424) 241 10 72

<https://elazig.tarimorman.gov.tr/>



ELAZIĞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ



Kanadı noktalı sirke sineği
(Drosophila suzukii)

Belirtileri: Önemli bir karantina zararlısı olan *Drosophila suzukii*, diğer *Drosophila* türlerinden farklı olarak ağaç üzerinde bulunan olgunlaşmış sağlıklı meyvelerde ve yere düşmüş, çürümekte olan meyve türlerinde beslenmektedir. Zararı larvalar meyve içinde beslenmek suretiyle meydana getirmektedir. Bir meyvede birden çok larva bulunabildiği için meyvede yumuşama ve çürüme belirtileri hızla artmaktadır.

KONUKÇULARI : Kiraz, kayısı, erik, şeftali, nektarin, armut, Trabzon hurması, kivi, incir, çilek, üzüm, elma, armut ve yaban mersini



Tanımı: Ergin, dişileri 3.2-3.4 mm, erkekleri 2.6-2.8 mm uzunluğundadır. Gözleri parlak kırmızı renklidir. Erkeklerin kanatlarında noktaları vardır. Dişilerin kanatlarında nokta yoktur bu yüzden diğer sirke sinekleri ile karıştırılabilir.



KONTROL VE ERADİKASYONU TALİMATI :

1. Meyveler olgunlaştığında hemen hasata başlanmalı ve hasattan sonra ağaç üzerinde meyve bırakılmamalıdır.
2. Bulaşık olduğu belirlenen bahçelerde yere dökülen meyveler toplanarak en az 30 cm. derinlikte uygun bir alana gömülmelidir.
3. Zararının bulunduğu alandan başka yerlere yayılmasına neden olabilecek mekanizmalar örneğin, traktör vb. ekipmanlar temiz tutulmalıdır.
4. Bahçelerde sulama damlama sulama sistemi ile yapılmalıdır. Özellikle bahçelerin hasata yakın dönemde aşırı sulanmasından kaçınılmalıdır.
5. Çayır ve meralar, terk edilmiş bahçeler zararlı için konukçuluk yapacağı için kontrol altında tutulmalıdır. Kendi haline bırakılmış meyve bahçelerinin bulunduğu yerlerde, otlar ve bakımsız ağaçların bulunduğu alanlar bulaşma kaynağı oluşturacağından kültürel önlemlere özen gösterilmelidir.
6. *Drosophila suzukii*'nin birkaç km uçabildiği bilindiğinden mücadelenin toplu mücadele şeklinde yapılması sağlanmalıdır. Bulaşık olduğu bilinen alan ve çevresindeki tüm bahçelerde yukarıda önerilen işlemlerin hepsi uygulanmalıdır.